核准日期：2022年02月25日 【用药须知】 对接受生长激素治疗的患者未而个体化 【儿童用药】 III 期临床试验： 最庆下注射量之一般重组人生长激素注射液，在 0.1 0.4mg/kg/d 范围内

Hormone Injection

汉语拼音：Juyi erchun Chongzu Ken Shengzhangjisu Zhusheye

YPSzh字 -2022

上市许可持有人

注册证号

国药准字 S20140001

【组 成】本品为二聚、一聚形成。

【性 状】本品为无色澄清液体。

【适应证】用于应知用生长激素治疗因遗传性生长激素缺

【用法用量】建议采用皮下注射三、以及常规生长激素治疗。

在下面所描的聚乙二醇重组人生长激素注射液治疗因遗传性生长激素缺

生长激素替代治疗与中枢神经系统肿瘤复发之间的关系尚不明确。

(n=522)，与安慰剂组相比，生长激素治疗(5.3-8mg/日)的死亡率显著增加（42% vs. 19%）。患有这些疾病的患者持续应用生长激素

速率。生长激素治疗可能会加重脊柱侧凸患者的侧凸进展程度。生长激

病例为 95 例。

注射：长期在同一部位进行皮下注射，可导致皮下脂肪萎缩不

(n=32) (n=31) (n=34)

和血脂水平降低。

一般存在不同。

注射剂型：PEG-rhGH

注射：本品应进行皮下注射