黄体酮注射液(II)说明书

请仔细阅读说明书并按照说明书使用或在医师指导下使用。

【药品名称】

通用名称：黄体酮注射液(II)

英文名称：Progesterone Injection (II)

汉语拼音：Huangtitongzhusheye (II)

【成份】

主成分：黄体酮

化学名称：孕烯-4-烯-3，20-二酮

化学结构式：



分子式：$C_{21}H_{30}O_2$

分子量：314.47

辅料：羟丙基倍他环糊精、注射用水

pH值：6.0~8.0

渗透压摩尔浓度：270±30mOsmol/kg

【性状】

本品为无色的澄明液体。

【适应症】

用于辅助生殖技术(ART)中黄体期支持治疗。

适用于不能使用或不能耐受阴道制剂的女性。

【规格】

1.112ml：25mg

【用法用量】

皮下或肌肉注射。从取卵当天开始每日注射一次2.5毫克，通常持续到妊娠测试。

本品由患者本人注射或有专用人员进行皮下/肌肉注射或前往医院进行肌肉注射。

【不良反应】

下表展示了在临床试验期间接受黄体酮注射液报告的主要不良反应。数据以系统器官分类(SOC)和频率表示。

系统器官分类	频率
注射部位反应	常见
注射部位疼痛、注射部位红斑、注射部位硬结、注射部位水肿、注射部位瘙痒、注射部位出血、注射部位血肿、注射部位反应、注射部位坏死、注射部位感染、注射部位脓肿、注射部位炎症、注射部位刺激、注射部位不适、注射部位肿胀、注射部位皮疹、注射部位荨麻疹、注射部位发热、注射部位发冷、注射部位麻木、注射部位刺痛、注射部位烧灼感、注射部位压迫感、注射部位瘀斑、注射部位结节、注射部位脂肪萎缩、注射部位脂肪增生、注射部位色素沉着、注射部位瘢痕、注射部位溃疡、注射部位坏死性筋膜炎、注射部位脓毒症、注射部位败血症、注射部位菌血症、注射部位真菌血症、注射部位寄生虫血症、注射部位病毒血症、注射部位脓毒性休克、注射部位感染性休克、注射部位过敏性休克、注射部位血管性水肿、注射部位荨麻疹、注射部位皮肤瘙痒、注射部位皮疹、注射部位红斑、注射部位水疱、注射部位大疱性表皮松解、注射部位剥脱性皮炎、注射部位多形性红斑、注射部位结节性红斑、注射部位白斑、注射部位白癜风、注射部位黑素瘤、注射部位基底细胞癌、注射部位鳞状细胞癌、注射部位皮肤癌、注射部位良性皮肤肿瘤、注射部位恶性皮肤肿瘤、注射部位皮肤肿瘤、注射部位皮肤癌、注射部位皮肤良性肿瘤、注射部位皮肤恶性